

大腸粘膜下層剥離術 入院診療計画書

消化器科

様 ID: _____

病名: _____

入院日 年 月 日

月 日	経 過	入院日（手術前日）	手術当日（術前）	術 後	術後一日目	術後二日目から退院前日	退 院 予 定 日	退院後の療養の注意点
	<p>・採血、心電図、レントゲンをとります</p>	<p>・ネームバンドをつけます。</p>	<p>・手術後、腹部レントゲン撮影をします。</p>	<p>・手術後、腹部レントゲン撮影をします。</p>	<p>・採血をします。 ・腹部レントゲン撮影をします。</p>	<p>・血液検査と腹部レントゲン撮影をします。</p>	<p>1 日常生活の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> -規則正しい生活をしましょう -食事は十分時間をかけましょう -便通を整えましょう -特に食事制限は 	
検査・処置								<ul style="list-style-type: none"> -退院後1週間は出血の可能性があります。排便時、便の色、状態を観察しましょう。（下血に注意）
全身管理	<p>・体温、脈拍、血圧を測定します。測定は退院まで行います。</p>	<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -退院後1週間は出血の可能性があります。排便時、便の色、状態を観察しましょう。（下血に注意）
注 射		<p>・体温、脈拍、血圧を測定します。測定は退院まで行います。</p>	<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ストレスはためないようにしましょう -下剤は退院後1週間は内服しないでください。
注 射		<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ストレスはためないようにしましょう -下剤は退院後1週間は内服しないでください。
内 服	<p>※現在内服中の薬があればお話しください。 ※一時中止の薬をお知らせします。（ / ~ を中止してください）</p>	<p>・インスリンや内服中の薬があれば看護師に話してください。</p>	<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
内 服		<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
食 事	<p>＜食事について＞ 大腸粘膜下層切除術の入院数日前から以下の食べ物は避けて下さい。</p>	<p>・夕食は、低残渣食になります。夜9時以降、絶食となります。</p>	<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
食 事		<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
安 静 度	<p>①食物繊維の多い食べ物</p>	<p>・夕食は、低残渣食になります。夜9時以降、絶食となります。</p>	<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
安 静 度		<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
清 潔	<p>②小さな種のある食べ物</p>	<p>・夕食は、低残渣食になります。夜9時以降、絶食となります。</p>	<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
清 潔		<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
排 泄	<p>③きのこ類や海藻類</p>	<p>・夕食は、低残渣食になります。夜9時以降、絶食となります。</p>	<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
排 泄		<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
指 導	<p>・手術方法、日程等、医師より説明があります。（家人同席）</p>	<p>・夕食は、低残渣食になります。夜9時以降、絶食となります。</p>	<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
指 導		<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
そ の 他	<p>・入院証書をお渡ししますので記入して当日持参してください。当日は印鑑を忘れずにお持ち下さい。 ・全館禁煙です。</p>	<p>・夕食は、低残渣食になります。夜9時以降、絶食となります。</p>	<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。
そ の 他		<p>・おなかの痛みや出血の観察をします。 ・出血がありましたら流さずナースコールにてお知らせ下さい</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<p>・手術後と同様に観察をします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> -飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。 -今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。

◎入院時、本紙を忘れずにご持参ください。入院後もこの用紙にて説明いたします。
 注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わりえるものです。
 注2 入院期間については現時点で予想されるものです。
 担当医師名 _____ 担当看護師名 _____

2017年 10月 改訂

患者様署名 _____

退院後の療養の注意点

1 日常生活の注意事項

- 規則正しい生活をしましょう
- 食事は十分時間をかけましょう
- 便通を整えましょう
- 特に食事制限は

・退院後1週間は出血の可能性があります。排便時、便の色、状態を観察しましょう。（下血に注意）

・ストレスはためないようにしましょう

・下剤は退院後1週間は内服しないでください。

・飲酒は一週間位ひかえた方が良いでしょう。

・今まで下剤を内服されていた方は退院後の内服について、医師に相談してください。

2 以下の症状がでたら、飲食を中止し、電話連絡をし必要時病院を受診しましょう。

- ・腹痛
- ・吐き気
- ・おなかの張り
- ・下血

等

・次回受診日は予約票をお渡します。

＜退院後初めて受診される場合＞

①プラスチックの診察券で受付して下さい。

②予約票は消化器科外来の窓口に提出して下さい。

土・日と夜間は休診ですが、診察が必要な場合は、救急外来で対応いたします。

大崎市民病院
TEL 0229-23-3311

退院おめでとうございます