

レジメン名		1クールの日数		
大腸がん FOLFIRI+weekly C-mab療法		14日		
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	基準値	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	セツキシマブ(アービタックス)・C-mab	初回400mg/m ² 以後250mg/m ²	div	d1, d8
2	イリノテカン(カンプト)・CPT-11	150mg/m ²	div	d1
3	レボホリナート・I-LV	200mg/m ²	div	d1
4	フルオロウラシル・5-FU	400mg/m ²	bolus	d1
5	フルオロウラシル・5-FU	2400mg/m ²	civ	d1から46時間

がん薬物療法レジメン処方		
投与日	薬品名	投与時間
day1	① 生理食塩液 500mL+セツキシマブ 400mg/m ² ・1クール目day1のみ400mg/m ² (120分)、 以後250mg/m ² (60分)で投与継続	初回120分 継続60分
	② 5%ブドウ糖液 250mL+イリノテカン 150mg/m ² ・レボホリナートと同時投与	120分
	③ 5%ブドウ糖液 250mL+レボホリナート 200mg/m ²	120分
	④ 5%ブドウ糖液 20mL+フルオロウラシル 400mg/m ²	5分
	⑤生理食塩液+フルオロウラシル 2400mg/m ² ・全量92mLに調製	46時間
day8	① 生理食塩液 500mL+セツキシマブ 250mg/m ² ・1クール目day1のみ400mg/m ² (120分)、 以後250mg/m ² (60分)で投与継続	60分