

レジメン名		1クールの日数		
大腸がん mFOLFOX6+BEV療法		14日		
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	基準値	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	ベバシズマブ・BEV	5mg/kg	div	d1
2	オキサリプラチン・L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	div	d1
3	レボホリナート・I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	div	d1
4	フルオロウラシル・5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	bolus	d1
5	フルオロウラシル・5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	civ	d1から46時間

がん薬物療法レジメン処方		
投与日	薬品名	投与時間
day1	① 生理食塩液 100mL+ベバシズマブ 5mg/kg ・初回90分、以後60分、30分と短縮可	90分
	② 5%ブドウ糖液 250mL+オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> ・レボホリナートと同時投与	120分
	③ 5%ブドウ糖液 250mL+レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup>	120分
	④ 5%ブドウ糖液 20mL+フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup>	5分
	⑤ 生理食塩液+フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup> ・全量92mLに調製	46時間