

| レジメン名              |                      | 1クールの日数               |       |             |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------|
| 大腸がん FOLFIRI+AFL療法 |                      | 14日                   |       |             |
| 番号                 | 抗癌剤名(商品名)・略号         | 基準値                   | 投与方法  | 投与日(d1,d8等) |
| 1                  | アフリベルセプト(ザルトラップ)・AFL | 4mg/kg                | div   | d1          |
| 2                  | イリノテカン(カンプト)・CPT-11  | 150mg/m <sup>2</sup>  | div   | d1          |
| 3                  | レボホリナート・I-LV         | 200mg/m <sup>2</sup>  | div   | d1          |
| 4                  | フルオロウラシル・5-FU        | 400mg/m <sup>2</sup>  | bolus | d1          |
| 5                  | フルオロウラシル・5-FU        | 2400mg/m <sup>2</sup> | civ   | d1から46時間    |

| がん薬物療法レジメン処方 |  |      |
|--------------|--|------|
| 投与日          | 薬品名  | 投与時間 |
| day1         | ① 生理食塩液 100mL + アフリベルセプト 4mg/kg                                | 60分  |
|              | ② 5%ブドウ糖液 250mL + イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup><br>・レボホリナートと同時投与 | 120分 |
|              | ③ 5%ブドウ糖液 250mL + レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup>                 | 120分 |
|              | ④ 5%ブドウ糖液 20mL + フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup>                 | 5分   |
|              | ⑤ 生理食塩液 + フルオロウラシル 2400mg/m <sup>2</sup><br>・全量92mLに調製         | 46時間 |