

パージェタ療法

～ 治療スケジュール ～

| お薬の名前 | 1日目 | 2~21日目 |
|-------------------|--|--------|
| パージェタ (ペルツスマブ) |  初回 60分 | お休み |

治療中の注意点

点滴部位に強い痛みや腫れ、かゆみを感じた場合はお知らせ下さい。

気分が悪い、寒気、動悸、息切れ、顔や体がかゆいなどの症状が現れた場合はお知らせ下さい。

起こりやすい副作用

■ 心障害

心障害の主な初期症状として、階段や坂道をのぼるだけでも息苦しさを感じる、疲労感が続く、咳が多くなる、手足にむくみが生じるなどの症状があります。定期的に心臓の検査を行います。

⇒上記のような症状が気になる場合、心臓の病気の既往がある場合はお知らせ下さい。

■ インフュージョン・リアクション

投与中から投与後、アレルギーに似た症状が出ることがあります。

寒気、気分が悪い、顔や体がかゆい、息苦しい、頭痛、などの症状が起きた時は、すぐにスタッフを呼んで下さい。

！連絡をいただきたい症状！

- 38°C以上の発熱があるとき。
- 食事や水分をとれないほどの吐き気や嘔吐があるとき。
- 1日7回以上の下痢があるとき。
- 乾いた咳が続く、または息切れを感じるとき。（間質性肺炎）