


HP療法（継続用）

～ 治療スケジュール ～

お薬の名前	1日目	2～21日目
トラスツズマブ (トラスツズマブ)	 30分	お休み
パージェタ (ペルツズマブ)	 30分	お休み

治療中の注意点

点滴部位に強い痛みや腫れ、かゆみを感じた場合はお知らせ下さい。

気分が悪い、寒気、動悸、息切れ、顔や体がかゆいなどの症状が現れた場合はお知らせ下さい。

起こりやすい副作用

■心障害

心障害の主な初期症状として、階段や坂道をのぼるだけでも息苦しさを感ずる、疲労感が続く、咳が多くでる、手足にむくみが生じるなどの症状があります。定期的に心臓の検査を行います。

⇒上記のような症状が気になる場合、心臓の病気の既往がある場合はお知らせ下さい。

■インフュージョン・リアクション

投与中から投与後、アレルギーに似た症状が出る場合があります。

寒気、気分が悪い、顔や体がかゆい、息苦しい、頭痛、などの症状が起こった時は、すぐにスタッフを呼んで下さい。

！ 連絡をいただきたい症状！

- 38℃以上の発熱があるとき。
- 食事や水分をとれないほどの吐き気や嘔吐があるとき。
- 1日7回以上の下痢があるとき。
- 乾いた咳が続く、または息切れを感じる時。（間質性肺炎）