



お薬の名称

を使用される患者さんへ

治療後に以下のような症状が起こることがあります。

症状がみられたら医師、看護師、薬剤師にご相談ください。

特に左側の下線を引いた症状がみられた場合はご注意ください。

☐ 37.5度以上の発熱

間質性肺炎

- ☐ 息苦しい
- ☐ 咳が増えた

I 型糖尿病

- ☐ のどがひどく渴く
- ☐ 水を多く飲む
- ☐ 尿量が増える

大腸炎

- ☐ 腹痛
- ☐ 下痢
- ☐ 便に血が混じる

重症筋無力症・筋炎

- ☐ ものが二重に見える
- ☐ まぶたが重い
- ☐ 手足に力が入らない
- ☐ 筋肉痛

ぶどう膜炎

- ☐ 目がかすむ
- ☐ 見えにくい

内分泌障害

- ☐ 疲れやすい
- ☐ だるい
- ☐ 体重の増減

肝機能障害

- ☐ 白目や皮膚が黄色くなる

腎機能障害

- ☐ 尿量が減る
- ☐ 血尿がでる
- ☐ むくみ

皮膚障害

- ☐ 皮膚がかゆい
- ☐ 発疹や水ぶくれが出る
- ☐ 口内炎が出る

神経障害

- ☐ 手足のしびれや痛み
- ☐ 運動・感覚のマヒ

緊急連絡先 | 0229-23-3311 (代表)

平日8:30-17:15 科外来

上記以外(夜間・休日) 救急外来

お名前 診察券番号 主治医名 薬剤名

最後に治療を受けた日 症状

を必ずお伝えください。

2019年1月作成 大崎市民病院